

Dott. M. De Vecchis

Dott.ssa R. Lucera



UROLOGIA

PLASTICA DEL FRENULO


L'intervento propostovi ha lo scopo di trattare di allungare il frenulo del prepuzio

FRENULO BREVE



PRIMA

DOPO FRENULECTOMIA



MOTIVI DELL'INTERVENTO

E' indicato nel caso di un frenulo del prepuzio troppo corto e fastidioso o in caso di rottura dello stesso. Il frenulo del prepuzio è una piega della pelle che lega il prepuzio alla faccia inferiore del glande. Questo frenulo talvolta è troppo corto e può causare fastidi durante il rapporto sessuale. Questa brevità del frenulo può essere la causa della sua rottura durante un rapporto sessuale, che può provocare dolore e sanguinamento.

L'assenza del trattamento espone al rischio di dolore durante il rapporto sessuale, di rottura e di eiaculazione precoce.

ESISTONO ALTRE OPZIONI?

Non vi sono altre possibilità di trattamento al di fuori della plastica chirurgica.

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO

L'intervento si effettua in anestesia locale, tranne casi eccezionali

TECNICA OPERATORIA

L'intervento consiste in una incisione trasversale del frenulo, che viene poi suturato longitudinalmente, permettendo così di allungarlo.
Può essere attualmente inciso mediante laser.

DECORSO ABITUALE

L'intervento è eseguito in ambulatorio senza ospedalizzazione in anestesia locale..
Il dolore a livello della zona operata è abitualmente minimo e temporaneo ed è eventualmente calmato da analgesici.
Può persistere per alcuni giorni un fastidio a livello della cicatrice.

La cicatrizzazione avviene da 2 a 4 settimane, delle cure locali vengono prescritte per alcuni giorni. I punti di sutura cadono spontaneamente nel giro di 2 -3 settimane, quando non viene utilizzato il laser.

Il chirurgo vi darà le indicazioni della ripresa dell'attività sessuale.

RISCHI E COMPLICANZE

Nella maggioranza dei casi l'intervento si svolge senza complicanze. Tuttavia tutti gli atti chirurgici comportano un certo numero di rischi e complicanze:

Alcune complicanze sono legate all'età, al vostro stato generale, all'anestesia e sono possibili durante tutti gli interventi chirurgici.

Le complicanze dirette in relazione all'intervento sono rare ma possibili:

- Un sanguinamento o un ematoma può verificarsi dopo l'intervento con necessità di cure locali e raramente di un reintervento
- Un ritardo nella cicatrizzazione o un'infezione necessitano talora di cure locali prolungate.
- Cicatrice dolorosa, fastidiosa o inestetica.
- Diminuzione della sensibilità durante il rapporto sessuale
- Eccezionalmente lesione del glande e dell'uretra

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali talora non guaribili.

In corso di questo intervento, il chirurgo può trovarsi di fronte ad una scoperta o ad un evento imprevisto che necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.

Il sottoscritto _____

Dichiara d'aver ricevuto dal Dott. _____

Una dettagliata informazione scritta ed orale riguardante l'intervento propostomi e le eventuali complicanze.

Una copia della presente scheda mi è stata consegnata nel giorno del colloquio

Roma _____

Firma _____

Il vostro urologo è a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Dott. Massimiliano De Vecchis
Dott.ssa Rossana Lucera**

**Via Tagliamento, 25 – Cell: 335-394145
www.urologiadevecchis.it**